



新藥介紹

HMG-CoA還原酶抑制劑新選擇 - Pitavastatin

許承維 藥師

現代人的飲食越來越精緻化，也偏向高油高鹽高熱量的重口味，當攝取過多的醣類及油脂，若身體消耗不掉便以膽固醇及三酸甘油酯的形式囤積。血脂代謝異常（如：膽固醇、三酸甘油酯、低密度脂蛋白過高或高密度脂蛋白過低）常造成心血管疾病，在飲食及運動無法改善的狀態下就得用藥物來治療。

用於血脂代謝異常的藥物有：HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A) 還原酶抑制劑 (又稱 statin 類藥物，如：pitavastatin、atorvastatin、rosuvastatin)、菸鹼酸 (如：acipimox)、fibric acid 衍生物 (如：fenofibrate、gemfibrozil)、膽固醇吸收抑制劑 (如：ezetimibe)、膽酸結合樹脂 (如：cholestyramine resin)、抗高血脂複合製劑 (如：ezetimibe & simvastatin)。

本院新進藥品 pitavastatin (Livalo®) 2 mg/tab 屬於 HMG-CoA 還原酶抑制劑，可競爭性抑制 HMG-CoA 還原酶而抑制膽固醇在肝臟的生合成。LDL-受體因而表現增加，加速肝臟對血液中 LDL 之清除，進而降低血漿中總膽固醇濃度。

Pitavastatin 適應症為原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常，其用法用量為：成人每日使用 1 次，於晚餐後口服 1-2 mg。於療程開始或劑量調整 4 週後檢測血脂濃度評估藥效，進而調整為適當之劑量。若 LDL-C 降幅未達預期可提高藥物劑量，每日最高劑量為 4 mg。

對於輕、中度腎功能不全 (腎絲球過濾率 30

至 80 mL/min/1.73 m²) 及正接受血液透析的末期腎臟病患者：pitavastatin 起始劑量為每日一次 1 mg，最高劑量為每日一次 2 mg。若腎絲球過濾率小於 30 mL/min/1.73m² 則不建議使用。

在交互作用方面，若 pitavastatin 併用 erythromycin 時，將可能增加其血中濃度，因此 pitavastatin 每日單次劑量不可超過 1 mg；若併用 rifampin 時，每日單次劑量則不可超過 2 mg。而併用 lopinavir/ritonavir 或 cyclosporine 因大幅增加 pitavastatin 血中濃度，因此禁止併用。合併 gemfibrozil 或 fenofibrate 則可能增加肌肉病變風險，也應避免使用。

Pitavastatin 常見之不良反應為肌肉疼痛 (1.9%-3.1%)、背痛 (1.4%-3.9%)、腹瀉 (1.5%-2.6%)、便秘 (1.5%-3.6%) 及四肢疼痛 (0.6%-2.3%)。

Pitavastatin 對骨骼肌的影響 (如肌肉病變及橫紋肌溶解症) 具劑量依存性，並與高齡 (> 65 歲)、腎功能不全、甲狀腺機能低下及合併使用 fibrate 類藥物相關，若出現骨骼肌相關症狀則應立即停藥。Pitavastatin 也可能有不明原因的肝臟酵素上升現象，因此在治療前及治療中應持續監測肝臟酵素。

與其他 statin 類藥品相同，pitavastatin 懷孕分級為 X，可能造成胎兒異常或流產，禁用於懷孕或可能懷孕之婦女。目前尚不了解 pitavastatin 是否分泌至母乳，所以需用 pitavastatin 治療的婦女不建議進行哺乳。

Pitavastatin 除了降低膽固醇、三酸甘油酯、低密度脂蛋白及 Apo-B 外，亦可增加高密度脂蛋白，而其與 cytochrome P450 系統代謝作用極少，因此交互作用相對於其他 statin 類藥物來得少些，所以若有相關考量時，pitavastatin 即可作為降血脂用藥的另一新選擇。


▣ 藥物不良反應

表：102 年 3 月至 102 年 5 月花蓮慈院 ADR 通報案件

=臨床藥學科整理=

| | 可疑藥品 | 不良反應 | 嚴重度 | 相關性 |
|----|---|-----------------------|-----|------|
| 1 | GALVUS Met® tab (Valdagliptin 50 mg & Metformin 500 mg) | 乳酸性酸中毒 | 重度 | 極有可能 |
| 2 | GLYPRESSIN® 1 mg/5 ml/amp (Terlipressin) | 四肢發紺 | 中度 | 確定 |
| 3 | Stilnox® (Zolpidem) | 嘔吐、昏睡意識及容易 噎到 | 中度 | 確定 |
| 4 | Colimycin® 2 MU/vial (Colistin Methanesulfonate) | 急性腎損傷 | 中度 | 極有可能 |
| 5 | Anbicyn® 針劑 600 mg/vial (Amoxicillin & Clavulanic Acid) | 皮疹 | 中度 | 極有可能 |
| 6 | Sinatrix® 1 g/vial (Ceftriaxone Na) | 顆粒性白血球缺乏症 | 中度 | 極有可能 |
| 7 | Tapimycin® 4 g-0.5 g/vial (Piperacillin - Tazobactam) | 全血球減少 | 中度 | 極有可能 |
| 8 | Vancomycin | 皮疹及臉部、頸部與上 肢之血管性水腫 | 中度 | 極有可能 |
| 9 | K-Citrate® 3300 mg/5 gm/pk (Potassium Citrate & citric) | 高血鉀 | 中度 | 極有可能 |
| 10 | Dilantin® 100 mg/cap (Phenytoin) | 全身性皮膚疹 | 中度 | 極有可能 |
| 11 | Cymevene 500 mg/vial (Ganciclovir) | 全血球減少 | 中度 | 可能 |
| 12 | Baktar® (Sulfamethoxazole 400 mg & Trimethoprim 80 mg) · Valcyte® 450 mg/tab (Valganciclovir) · FLU-D® (Fluconazole) 150 mg/cap | 皮疹 | 輕度 | 確定 |
| 13 | S-60® 1000 mg/vial (Cephadrine) | 皮疹 | 輕度 | 確定 |
| 14 | Beenrone 50 mg/tab (Benzbromarone) | 肝炎 | 輕度 | 極有可能 |
| 15 | 麻黃附子細辛湯 | 心悸、失眠 | - | - |
| 16 | 芍藥 | 頸部與雙膝無力，動作 較費力 | - | - |
| 17 | 麻黃附子細辛湯 | 心悸、失眠、血壓高 | - | - |
| 18 | 大黃 | 腹瀉 | - | - |

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 3297、3097 電話通報。



服用含 carbimazole 類之藥品於轉換廠牌後，可能產生頭痛、頭暈與皮膚起疹之不良反應

全國藥物不良反應通報中心近日接獲病人疑似服用含 carbimazole 類藥品，於轉換廠牌後發生頭痛、頭暈及皮膚起疹的不良反應。

依據現有不良反應通報之資料顯示，目前仍舊無法確認病人之不良反應與更換廠牌是有相關性的，因此僅建議於更換 carbimazole 類藥品廠牌時，醫療人員應監測病人甲狀腺功能，並密切了解病人用藥後是否有發生不良反應之情形。

目前食品藥物管理局將持續追蹤病人服用 carbimazole 成分所造成之不良反應案件後續通報情形。

本院品項：Carbizo® 10 mg/tab (Carbimazole)

含 diphenhydramine 成份藥品之再評估相關事宜

行政院衛生署近期公告修訂 102 年 2 月 25 日「含 diphenhydramine 成份藥品之再評估相關事宜」。

公告事項：

- 一、 有關旨揭公告其公告事項第一項第一點「1. 嬰幼兒 (premature infant 及 neonate) 不建議使用」，修訂為「1. 早產兒 (premature infants) 及新生兒 (neonate) 不建議使用」。
- 二、 持有前項成份藥品許可證者，惠請於 102 年 8 月 31 日前自行依本案公告事項一完成中文仿單變更並留廠 (商) 備查，另將變更後仿單電子檔 (PDF 檔) 函送本署食品藥物管理局。

本院品項：Panacal® 30 mg/ml/amp (Diphenhydramine HCl)

含 nilotinib 成份藥品可能提高粥狀動脈硬化相關疾病之風險

加拿大衛生單位 (Health Canada) 近日發布，於臨床試驗及上市後經驗中皆發現，使用 nilotinib 成份藥品曾有發生動脈粥狀硬化相關疾病之案例，例如：周邊動脈阻塞性疾病、股動脈狹窄、冠狀動脈狹窄、頸動脈狹窄及腦血管意外。

建議病人於治療期間應監測動脈粥狀硬化相關疾病的症狀，且於治療前及治療期間應密切監測血脂和血糖。並說明將於該成份藥品仿單之警語、注意事項及上市後不良反應等處更新上述安全資訊。

◎食品藥物管理局後續措施：

原廠 (台灣諾華股份有限公司) 近期已向本局主動申請該成分中文藥品仿單更新，加註「動脈硬化閉塞症」、「周邊動脈阻塞性疾病」、「血栓」...等相關內容，亦將加註有關建議監測患者血脂生化數值等相關事項。

◎醫療人員應注意事項：

建議醫師於病人使用 nilotinib 成分藥品治療前及其治療期間，應密切監測血脂和血糖，並注意病人是否出現動脈粥狀硬化相關疾病之症狀。

本院品項：Tasigna® 150 mg/cap (Nilotinib)

Tasigna® 200 mg/cap (Nilotinib)

含 thalidomide 成分藥品可能提高第二原發性癌症之風險

加拿大衛生部 (Health Canada) 於今年 5 月 22 日發布 thalidomide 成分藥品可能增加第二原發性癌症之風險。

於臨床試驗中發現，未曾接受過治療之多發性骨髓瘤病患接受 melphalan、prednisone 及 thalidomide 的合併治療，相較以 lenalidomide 併用 dexamethasone 的治療，將顯著提高急性骨髓性白血病 (acute myeloid leukemia, AML) 及骨髓生發不良症候群 (myelodysplastic syndrome, MDS) 風險，而 thalidomide 發生上述不良反應風險亦隨用藥時間而提高。

加拿大衛生部 (Health Canada) 將加註上述資訊於仿單的「警語及注意事項」及「病人資訊」欄，且提醒醫師在使用 thalidomide、melphalan 及 prednisone (MPT) 的合併治療前，應考量 AML 及 MDS 風險，並應於治療前及期間以標準癌症篩檢方式仔細評估是否發生第二原發性癌症。

◎食品藥物管理局後續措施：

食品藥物管理局將彙整國內外相關資料，進行該藥品之安全性再評估。

◎醫療人員應注意事項：

在本局未有進一步評估結果前，請醫師謹慎評估病人使用該藥品之臨床效益與風險，並監視病人用藥後發生不良反應之情形。

本院品項：Thado® 50 mg/cap (Thalidomide)

FDA 發布含 tolvaptan 成分藥品可能引起肝臟傷害之風險

本院 104 期藥訊曾提過 tolvaptan 成分藥品之相關藥物警訊，而今年 4 月 30 日美國 FDA 再發布有關含 tolvaptan 成分藥品可能引起肝臟傷害，發生導致肝臟移植、甚至死亡之風險。

Samsca® (tolvaptan) 不應服用超過 30 天，且有潛在肝臟疾病之病人更不應服用，因其可能引起肝臟之損傷，發生導致肝臟移植、甚至死亡之風險。

因此有以下之建議：

1. 病患若出現肝臟疾病徵兆，應停止服用 tolvaptan。
2. 病患服用 tolvaptan 天數不可超過 30 天。
3. 有潛在肝臟疾病 (包含肝硬化) 病患應避免使用 tolvaptan。
4. 病患若於服用 tolvaptan 之過程有任何肝臟損傷相關疑慮，應與開藥醫師聯絡。

本院品項：Samsca® (Tolvaptan) 15 mg/tab

FDA 發布將 valproate 相關成分抗癲癇藥品用於預防懷孕婦女之偏頭痛列為禁忌。

今年 5 月 6 日美國 FDA 發布將 valproate 相關成分抗癲癇藥品用於預防懷孕婦女之偏頭痛列為禁忌。

發布 valproate sodium 之用藥安全警訊，重點如下：

1. 依據 NEAD 試驗，母體懷孕期間暴露於 valproate 成分藥品的孩童，相較暴露於其他抗癲癇藥品，6 歲時有較低之智商 (IQ scores) 。
2. 美國 FDA 要求廠商修改相關成分之藥品仿單，包括：
 - (1) 將該成分藥品用於預防懷孕婦女之偏頭痛列為禁忌，並建議適孕年齡女性，除非必要，否則不應服用該成分藥品；若需服用時，則應採取避孕措施。
 - (2) 將該類成分藥品用於偏頭痛的孕婦用藥安全級數從“D”級提升為“X”級，但用於治療癲癇及躁鬱症躁期的孕婦用藥安全級數仍維持“D”級。

建議在未有進一步之評估結果前，不應使用該成分藥品於懷孕婦女之偏頭痛。醫師於開立該成分藥品於適孕婦女，應詢問病患是否懷孕，小心評估其效益與風險，並告知使用該類成分藥品可能之風險，必要時提醒病患進行避孕措施。

備註：本院已配合修改其懷孕分級。

本院品項：Depakine 200 mg/enteric-coated tab (Valproate)
Depakine 500 mg/FC tab (Valproate Na)
Depakine Soln 200 mg/ml ; 40ml/bot (Valproate)
Depakine 針劑 400 mg/vial(Valproate Sodium)

※ 資料來源：行政院衛生署藥物不良反應通報中心

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 3297、3097 電話通報。




人與人相處之道，
應如星球運轉，
能自身圓融，
更要調整腳步彼此配合。

證嚴法師靜思語

102年05月新進藥品

| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|---|--------|
| Dutasteride & Tamsulosin 0.5 & 0.4 mg /cap | Duodart 多適達膠囊 (荷商葛蘭素史克) 衛署藥輸字第 025423 號 | 橘色/棕色 長橢圓形 口服/膠囊 GS7CZ | 具有症狀且攝護腺增大之攝護腺肥大症的第二線治療。 | 此藥可經由皮膚吸收, 懷孕或可能懷孕的婦女應避免處理此膠囊。請勿嚼食或將膠囊打開。 | 43.6 元 |
|  | | | | | |
| Flupentixol 0.5 mg/tab | Fute 安平靜膜衣錠 (東竹) 衛署藥製字第 049577 號 | 粉紅色 圓形 口服/錠劑 0.5/EB | 治療精神疾病相關症狀。 | 避免與酒精併服。 ※本院同成份不同劑量藥品有Fute® (Flupentixol) 5 mg/tab ※臨時採購, 限精神科醫師處方。 | 3.1 元 |
|  | | | | | |

| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|----------------------------|---|--------------------------|---|---|---------------|
| Roflumilast 500 mcg/tab | Daxas 迪開舒膜衣錠 (臺灣武田) 衛署藥輸字第 025573 號 | 黃色 三角形 口服/錠劑 D | 適用於重度慢性阻塞性肺疾 (使用支氣管擴張劑後FEV1低於預期數值的 50%)，並伴隨頻繁惡化病史的成年慢性支氣管炎患者，作為支氣管擴張劑治療的維持治療。 | 1. 需要服用數週才能見效。 2. 可能使體重減輕。 ※臨時採購，限胸腔內科醫師處方。 | 自費 73.08 元 |
| |  | | | | |
| Agomelatine 25 mg/tab | Valdoxan 煩多閃膜衣錠 (施維雅) 衛署藥輸字第 025451 號 | 黃色 橢圓形 口服/錠劑 圖騰 | 成人重鬱症。 | 1. 服藥後需定期監測肝功能。 2. 可能造成嗜睡效果，請小心。 ※臨時採購，限精神科、神經內科醫師處方。 | 38 元 |
| |  | | | | |

| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|---|---|--------|-------------------------------|--|---------|
| Nystatin Susp 0.1 MU/mL ; 24 mL/bot | Mycostatine (健亞) 專案進口 | 口服/懸液劑 | 白色念珠菌所引起之口腔、皮膚及腸。 | 1. 使用前需搖勻，可以直接使用。 2. 開瓶後，25℃以下可存放7天。 | 78 元 |
| |  | | | | |
| Denosumab 120 mg/1.7 mL/vial | Xgeva 癌骨瓦注射液 (荷商葛蘭素史克) 衛署菌疫輸字第 000924 號 | 針劑/注射 | 適用於預防後期惡性腫瘤已擴散至骨骼的患者發生骨骼相關事件。 | 皮下注射。冷藏儲存，施打前需先置於室溫使之自然回溫。 ※院內同成份不同劑量之藥品尚有 Prolia®60 mg/mL/vial ※臨時採購，限泌尿科、一般外科醫師處方。 | 11102 元 |
| |  | | | | |


| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|--|---|-------|------------------------|---|-------|
| Isosorbide 700 mg/mL, 500 mL/bot | Isobide 施洛得液 (宜泰) 衛署藥輸字第 012963 號 | 口服/液劑 | 利尿、降眼壓、Meniere's 病之改善。 | 開封後應密封保存於冷處 (<8 °C)。依保存條件，可能多少有顏色之變化，但對藥效並無影響。 ※臨時採購，限耳鼻喉科、眼科醫師處方。 | 1235元 |
| |  | | | | |



102年05月換廠藥品


| 成分名 | 換廠前 | | 換廠後 | | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|--------|
| | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | | | |
| Glucosamine Sulfate 250 mg/cap | Osamine 復骨 (順生製藥) 衛署藥製字第 039484 號 | 紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 Osamine | Chian 節安 (羅得化學) 衛署藥製字第041894號 | 紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 ROOT/246 | 緩解退化性關節炎 之疼痛。 | 請遵照醫師或藥師指 示使用。 ※原廠商停產 | 1.62 元 |
| |  | |  | | | | |
| Calcium Folate | BW-folin (昱泰) 專案進口 | 針劑/注射 1000 mg/ 100 mL/vial | Calciumfolinat Ebewe 肯血福注射液 (諾華) 衛署藥輸字第 018833 號 | 針劑/注射 100 mg /10 mL/amp | 對抗葉酸拮抗劑。 | 冷藏保存； 不可口服。 劑型不同: 1000 mg/ 100 mL/vial 改 100 mg/10 mL/amp ※廠商缺貨 | 145 元 |
| |  | |  | | | | |

| 成分名 | 換廠前 | | 換廠後 | | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------|
| | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | | | |
| Sodium Chloride 0.9% 1000 mL/bt | Isotonic NaCl Solution 生理食鹽水 (信東) 內衛藥製字第 009997 號 | 針劑/塑膠瓶 | Saline 生理食鹽水 (南光) 衛署藥製字第 029836 號 | 針劑/塑膠瓶 | 水分及電解質之補充。 請遵照醫師或藥師指示使用。 ※原廠商恢復供貨。 | | 25.4 元 |
| |  | |  | | | | |
| Methotrexate | Emthexate 易滅得庇福 注射液 (台灣甯鉞) 衛署藥輸字第 017549 號 | 針劑/注射 1 g/40 mL/vial (25 mg/mL) | Ebetrexat 益伯偉每索特靜脈注射液 (台灣諾華) 衛署藥輸字第018876號 | 針劑/注射 500 mg/5 mL/amp (100mg/mL) | 妊娠性絨毛上皮癌、破壞性絨毛上皮腺腫、水囊狀胎塊、急性、亞急性、淋巴球性及腦膜性白血病、淋巴肉腫。 | 請避光。 (1020510) 含量劑型: 1 g/40 mL/vial (25 mg/mL) 改 500 mg/5 mL/amp (100 mg/mL) ※廠商缺貨 | 480 元 |
| |  | |  | | | | |

| 成分名 | 換廠前 | | 換廠後 | | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | | | |
| Fexofenadine 60 mg/tab | Fynadin 汎敏定 (中國化學) 衛署藥製字第 049113 號 | 粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 138CCP | Fexofenadine 飛敏耐 (中化裕民) 衛署藥製字第 057127 號 | 粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 138CCP | 緩解成人及六歲以上之兒童的季節性過敏性鼻炎及慢性自發性蕁麻疹相關症狀。 | 此藥可能會造成胃不舒服。服藥期間建議與食物或牛奶併服。 | 3.14 元 |
| |  | |  | | | | |
| Human Albumin | Plasbumin-25 白蛋白 (天行貿易) 衛署菌疫輸字第 000197 號 | 針劑/注射 25%, 12.5 g / 50 mL/bot | Plasbumin-20 白蛋白注射劑 (天行貿易) 衛署菌疫輸字第 000777 號 | 針劑/注射 20%, 10 g/50 mL/bot | 低蛋白血症、休克、燒傷。 | 含量變更： 25%改20% ※原廠商恢復供貨。 | 1212 元 |
| |  | |  | | | | |


| 成分名 | 換廠前 | | 換廠後 | | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|----------------------------------|-------|
| | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | | | |
| Acetylsalicylate Acid 500 mg/vial, | Stin 賜鎮 (中國化學) 衛署藥製字第 010871 號 | 針劑/注射 | Lyacety 解你疼 (中化裕民) 衛署藥製字第 057374 號 | 針劑/注射 | 對不能口服NSAID 之成年病人強烈疼 痛之短期治療、成人 發燒症狀之緩解。 | 懷孕第6個月起禁用。 | 15 元 |
| |  | |  | | | | |
| Nifedipine 30 mg/tab | Nifecardia SR 冠脈循 (中國化學) 衛署藥製字第 045177 號 | 磚紅色 圓形 口服/錠劑 | Nifedipine 恆脈循 (中化裕民) 衛署藥製字第 057219 號 | 磚紅色 圓形 口服/錠劑 | 狹心症、高血壓。 | 避免與葡萄柚汁併 服；請整顆吞服。不 可撥半、磨粉。 | 8.4 元 |
| |  | |  | | | | |

| 成分名 | 換廠前 | | 換廠後 | | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|-------------------------------------|---|-------|---|-------|--|------------|-------|
| | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | | | |
| Octreotide Acetate 0.1 mg/mL/amp | Octide 歐肽 (汎生) 衛署藥製字第 046547 號 | 針劑/注射 | Sandostatin 善得定 (諾華) 衛署藥輸字第 017873 號 | 針劑/注射 | 對手術、放射線療法或DOPAMINE作用劑療法控制無效的肢端肥大症患者·可控制其症狀·並減少生長激素及SOMATOMED ; N-C的血漿值;解除與胃腸胰臟內分泌腫瘤有關的症狀;預防胰臟手術後的併發症·治療胃、食道靜脈曲張出血及預防再出血。 | 冷藏保存;不可口服。 | 429 元 |
| |  | |  | | | | |



102年05月停用藥品

| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|----------------------------------|--|--|---|---|--------|
| Finasteride 5 mg/tab | Proscar 波斯卡 (默沙東) 衛署藥輸字第 020198 號 | 藍色 六角形 口服/錠劑 PROSCAR/MSD72 | 良性前列腺增生。 | ※可替代藥品： 1. Avodart® (Dutasteride) 0.5 mg/cap | 27.5 元 |
| | |  | | | |
| Glatiramer Acetate 20 mg/vial | Copaxone 可舒鬆凍晶注射劑 (昱泰) 衛署罕藥輸字第 000009 號 | 針劑/注射 | 復發型多發性硬化症·COPAXONE 用於減少復發型多發性硬化症病人的復發頻率。 | ※藥品缺貨，本院無可替代藥品。 | 1063 元 |
| | |  | | | |

| 成分名 | 藥品名稱 | 外觀/劑型 | 用途/適應症 | 注意事項 | 健保價 |
|--|--|----------------------------------|---|---|---------|
| Conjugated Estrogen & Medroxy-progesterone 0.3 & 1.5 mg/tab; 28 tab/pk | Premelle Lite 普美來錠 (惠氏) 衛署藥輸字第 024101 號 | 米白色 橢圓形 口服/錠劑 W 0.3/1.5 | 1. 雌激素缺乏引起之中度至重度血管舒縮症狀。 2. 預防及治療與雌激素缺乏引起的骨質疏鬆症。 3. 萎縮性陰道炎及萎縮性尿道炎。 | ※可替代藥品： 1. Indivina®28 tab/box (Estradiol & Medroxyprogesterone) 2. Sevina® (Estradiol & Norethisterone Acetate) 3. Komeni® 28 tab/pk (Estradiol 1 mg & Norethisterone 0.5 mg) | 自費900 元 |
| |  | | | | |

