



慈濟藥訊

TZU CHI HOSPITAL PHARMACY BULLETIN

出版單位：花蓮慈濟醫院藥劑部
總編輯：劉采艷
執行編輯：陳仲揚
編輯：陳怡珊、黃欣怡、
黃詠銘、陳鈴潔、
彭鳳宜

新藥介紹

新預防氣喘吸入型類固醇

- Ciclesonide

林蔓昀 藥師

隨著現代過敏原及刺激物的增加，氣喘 (asthma) 成為盛行疾病之一。氣喘症狀包括呼吸困難、呼吸短促、胸悶和咳嗽等症狀，發生時間、頻率依個人而不同。台灣氣喘人口約有 200 萬人，而成人盛行率約 10 %，值得關注的是兒童氣喘盛行率高達 20 %。

除了減少接觸過敏原、壓力與刺激物外，治療氣喘用藥可分為兩大類，第一類為控制 (預防) 藥物：口服與吸入型類固醇、cromolyn、白三烯素調節劑 (leukotriene modifiers)、長效乙二型交感神經興奮劑 (long-acting β_2 -agonists)；第二類為緩解藥物 (支氣管擴張劑)：速效乙二型交感神經興奮劑 (short-acting β_2 -agonists)、抗乙酰膽鹼 (anti-acetylcholine)、茶鹼 (theophylline) 製劑、某些作用快速的長效乙二型交感神經興奮劑 (如：formoterol)。

本院新進藥品 ciclesonide 160 mcg/dose ; 60 dose/bot (Alvesco® 160 Inhaler “保衛康” 治喘樂吸入劑) 屬於吸入型類固醇，且為前趨藥物 (prodrug)，其對腎上腺皮質素受體 (adrenocorticotrophic hormone receptor) 親和力低，吸入後在肺泡被代謝成具有抗發炎活性的 des-ciclesonide。

在一為期 16 週之隨機、雙盲及安慰劑對照試驗中，691 位被診斷為輕度至中度持續性氣喘 (平均第一秒吐氣量 (FEV1) 為 72 %)，且之前只使用

支氣管擴張劑治療的患者，被隨機分成四組，分別給予 ciclesonide 160 mcg 經口吸入每天早上一次、80 mcg 每天兩次、80 mcg 每天兩次，4 週後再給 160 mcg 每天早上一次持續 12 週及安慰劑。與安慰劑相比，給予 ciclesonide 160 mcg 每天早上一次可使早上給藥前的 FEV1 增加 0.12 L (5.0%)；80 mcg 每天兩次可增加 0.24 L (10.4%)；80 mcg 每天兩次持續 4 週，再給 160 mcg 每天早上一次持續 12 週可增加 0.13 L (5.0%)。

目前 ciclesonide 的衛生福利部核准適應症為：使用於成人、青少年及四歲以上兒童之持續性氣喘，但對於急性氣喘並不能有效緩解症狀。建議用法用量：兒童 (4 - 11 歲) 為每天 80 ~ 160 mcg，成人與青少年病患則為每天 80 ~ 1280 mcg，一般建議依個人嚴重度給予不同劑量，而老年人或肝腎功能受損病患無需調整劑量。當 ciclesonide 一天使用一次時，建議在晚上投與，不過白天使用還是有效的。由於藥劑經口吸入，使用後應漱口將沉積在口咽部的藥物洗去，以減少副作用。

Ciclesonide 在美國 FDA 懷孕分級為 C 級，由於在懷孕與授乳婦女上並無足夠的研究，除非評估後此藥的利大於弊，否則不建議使用。

Ciclesonide 常見的不良反應包括頭痛 (4.9 % ~ 11 %)、鼻咽炎 (7 % ~ 10.5 %)、鼻竇炎 (3.1 % ~ 5.5 %)、鼻充血 (1.8 % ~ 5.5 %)、喉嚨痛 (2.4 % ~ 4.7 %)、上呼吸道感染 (4.1 % ~ 8.7 %)。投與 ciclesonide 後，可能發生逆理性支氣管痙攣 (paradoxical bronchospasm)，此為所有吸入劑型非特定的急性反應，與藥品本身、賦形劑或氣化冷卻劑有關，若症狀嚴重，應停用 ciclesonide。

Ciclesonide 經由酵素 CYP3A4 代謝，所以應該

避免與強力 CYP3A4 抑制劑 (如：ketoconazole、itraconazole、ritonavir 及 nelfinavir) 併用，因為會使 ciclesonide 活性代謝物增加 3.5 倍。

使用吸入型類固醇雖可減少口服類固醇使用量及副作用 (如：抑制腎上腺功能、骨頭密度下降及青光眼)，但全身性副作用依舊可能發生。而


新的吸入型類固醇 ciclesonide 因進入體內後僅經肺部而不經胃腸系統進入全身循環，理論上更不易產生全身性之副作用。因此，若有病患對其他吸入型類固醇過敏或有全身性副作用之顧慮，ciclesonide 可供其選擇使用。

參考資料

1. Alvesco®藥品仿單
2. Global initiative for asthma: Pocket guide for asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years) , 2014; p5-15.
3. 徐世達, 黃立心, 余泰昌, et al : 氣喘治療指引·台灣氣喘衛教學會。2007 ; p5-13.

期刊閱讀分享

篇名	Carbapenem 類抗藥性及泛抗藥性 (Extensively Drug Resistant) 鮑氏不動桿菌 (Acinetobacter baumannii) 感染的治療選擇
內容摘要	鮑氏不動桿菌 (Acinetobacter baumannii ; AB 菌) 是健康照護機構相關感染最常見的菌種，carbapenem 類抗生素是主要治療藥物之一，但近期發現許多的 AB 菌感染為 carbapenem 類抗藥性及泛抗藥性 (Extensively Drug-Resistant ; XDR) 菌株。而這些抗藥性菌株感染的有效治療藥物尚未建立。 Polymyxins (如 colistin)、tigecycline 及 sulbactam 是最常用於治療 CRAB 或 XDRAB 的藥物，作者依實證的結果建議以 colistin 作為主幹的合併療法優於單一治療，可與 colistin 併用於治療的藥物除了第一線的 tigecycline 及 sulbactam 外，colistin 併用 vancomycin、rifampin 及 fosfomycin 亦有試驗顯示其益處。另外，儘早給予合適的抗生素治療可以增加病患的存活率，特別是重症的病患。
臨床結語	CRAB 或 XDRAB 感染的病患應及早給予以 colistin 作為主幹的抗生素合併療法。
資料來源	Drugs. 2014;74:1315-33.
撰稿作者	花蓮慈濟醫院藥劑部 臨床藥學科 黃欣怡 藥師



使用 omalizumab 成分藥品可能提高心血管及腦血管事件風險

一項美國 FDA 安全性回顧研究建議，氣喘患者使用 Xolair® (omalizumab) 比沒有使用 Xolair® 治療的心血管及腦血管事件風險稍微偏高。美國 FDA 已增加相關訊息於藥物仿單之中。

這項回顧研究亦有比較有無使用 Xolair® (omalizumab) 治療，其罹患癌症的機率並無明顯差異。然而，此研究僅為期 5 年，因此受限原因，FDA 尚無法排除 Xolair® 的潛在致癌風險。此訊息亦被加註於仿單中的注意事項。

本院品項：本院已於 102 年 7 月停用此品項 Xolair® 150 mg/vial (Omalizumab)。

※ 資料來源：U.S. FDA MedWatch

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 3297、3097 電話通報。

DD 健保給付規定修正

5.6.1 抗骨質再吸收劑 (anti- resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1)

自一百零三年十月一日生效

1. 藥品種類

- (1) Bisphosphonates (雙磷酸鹽類): alendronate (如 Fosamax)、zoledronate 5mg (如 Aclasta 5mg/100mL solution for infusion)、risedronate (如 Reosteo)、ibandronate 3mg/3mL (如 Bonviva 3mg/3mL solution for injection)
- (2) Selective estrogen receptor modulators (SERM, 選擇性雌激素接受體調節劑): raloxifene (如 Evista)、bazedoxifene (如 Viviant) (102/2/1)
- (3) Human monoclonal antibody for RANKL (RANKL 單株抗體): denosumab (如 Prolia) (101/3/1)

2. 使用規定

- (1) 限用於停經後婦女 (alendronate、~~及~~zoledronate 及 denosumab 亦可使用於男性，zoledronate 亦可使用於持續接受全身性類固醇藥物之病患) 因骨質疏鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score $\leq$ -2.5SD) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質減少症 (osteopenia) (經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD < T score < -1.0SD) 引起脊椎或髖部 2 處或 2 次 (含) 以上之骨折。(101/5/1、102/8/1、103/10/1)
- (2) 治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。
- (3) 使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。

本院品項：Fosamax Plus tab (Alendronate 70mg & Cholecalciferol 70 mcg)

Aclasta 5 mg/100 ml/vial (Zoledronic Acid)

Bonviva 3 mg/3 ml/syringe (Ibandronate Sodium)

Evista 60 mg/tab (Raloxifene)

Prolia 60 mg/ml/vial (Denosumab)

103 年 09 月新進藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Eculizumab 300 mg/30 mL/vial	Soliris (吉泰藥品) 專案進口	針劑/注射	陣發性夜間血紅素尿症患者有溶血性貧血且需輸血或有栓塞的併發症。	冷藏避光儲存。配製過程不可用力震搖。 (1030826公告) ※罕病用藥,須事前審查,限病人使用。	181380元
					
Sodium Carboxymethyl cellulose 0.5% ; 0.4mL/vial	Refresh Plus 麗眼舒 (愛力根) 衛署藥輸字第 023834 號	外用/眼用	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	單劑量包裝，須一次使用完。 (1030828公告)	260元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Cefoperazone & Sulbactam 500 & 500 mg/vial (1 g/vial)	Brosym 博益欣 (東洋) 衛部藥製字第 058156 號	針劑/注射	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染： 上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。	※臨採新藥，限病患使用。 (1030830 公告)	310 元
					
Dexlansoprazole 60 mg/cap	Dexilant 得喜胃通 (武田) 衛署藥輸字第 025887 號	藍色 長橢圓形 口服/膠囊 TAP 60	治療糜爛性逆流性食道炎；維持糜爛性逆流性食道炎已治療後之療效；非糜爛性胃食道逆流疾病之症狀治療。	無法吞服整顆膠囊時，可打開膠囊吞服全部藥物顆粒。 (1030905 公告)	25.9 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Maraviroc 150 mg/tab	Celsentri 新特滋 (葛蘭素) 衛署藥輸字第 024927 號	藍色 橢圓形 口服/膜衣錠 Pfizer/MVC150	Celsentri 與其他抗反轉錄病毒藥物併用，適用於對第一線抗反轉錄病毒藥物無法耐受或治療失敗，且只具 CCR5 趨性之 HIV-1 感染之成人患者。	請遵照指示服用。若發生肝炎或過敏反應，請停藥並就醫。對大豆或花生過敏之患者應避免使用。 (1030919 公告) ※臨採新藥，限感染科處方。	163.5 元
					
Maraviroc 300 mg/tab	Celsentri 新特滋 (葛蘭素) 衛署藥輸字第 024928 號	藍色 橢圓形 口服/膜衣錠 Pfizer/MVC300			163.5 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Regorafenib 40 mg/tab	Stivarga 癌瑞格 (拜耳) 衛部藥輸字第 026168 號	淡粉紅色 橢圓形 口服/膜衣錠 BAYER/40	gorafenib適用於治療先前曾接受下列療法的轉移性大腸直腸癌 (mCRC) 患者，療法包括 fluoropyrimidine-、oxaliplatin-、irinotecan- 為基礎的化療，和抗血管內皮生長因子 (anti-VEGF) 等療法；若 KRAS 為原生型 (wild type)，則需接受過抗表皮生長因子受體 (anti-EGFR) 療法。	配合低脂早餐使用。 (1030919公告) ※臨採自費新藥，限病患使用。	2436元
					



103 年 08 月換廠藥品

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ferric salt 100 mg/tab	La Ferrum 拿鐵 (倍斯特) 衛署藥輸字第 046758 號	黑色 圓形 口服/咀嚼錠 BMB/C01	Tedalin 鐵達寧 (元宙) 衛署藥製字第 046166 號	棕色 圓形 口服/咀嚼錠 YCP	預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。	本藥可能使糞便變成黑色。 (1030825 公告)	4.27 元
							
Tolperisone 150 mg/tab	Tolesin 泰樂欣 (信東) 衛署藥製字第 043633 號	白色 圓形 口服/膜衣錠 ST 123	Topee 肌鬆定 (育生) 衛署藥製字第 046184 號	白色 圓形 口服/膜衣錠 STD/138	反覆發生的疼痛性肌痙攣及腦部血管病變所導致之肌張力異常升高。	老年人服用本品，有嗜眠、肌無力之症狀，停藥則症狀會緩解。 (1030825 公告)	2.14 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ceftriaxone 1 g/vial	Sintrix 信得瑞 (信東) 衛署藥製字第 036751 號	針劑/注射	Ceftriaxone 西特亞 (諾華(Sandoz)) 衛署藥輸字第 024790 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	不可與含鈣溶液混合或併用。 (1030825 公告)	249 元
							
Bromazepam 3 mg/tab	Bropan 優寧 (政德) 衛署藥製字第 029503 號	紅色 圓形 口服/錠劑 GP/232	Bromazin 牟靜 (強生化學) 衛署藥製字第 026080 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 JCP 3	焦慮狀態。	可能造成嗜睡效果，請小心。請勿飲酒。 (1030826 公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Amoxicillin & Clavulanic Acid 1 g/tab	Curam 諾快寧 (諾華) 衛署藥輸字第 024808 號	白色 長橢圓形 口服/膜衣錠 刻痕	Augmentin 安滅菌 (葛蘭素史克) 衛署藥輸字第 022612 號	白色 長橢圓形 口服/膜衣錠 AC/刻痕	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙 球菌、腦膜炎球菌及其他具 有感受性細菌引起之感染 症。	請遵照醫師指示完 成全部療程。 (1030826 公告)	10.3 元
							
Cephalexin 500 mg/cap	Cephanmycin 適汎 (永信) 衛署藥製字第 023990 號	深綠色/綠色 長橢圓形 口服/膠囊 CCC 500	Cephalexin 賜福力欣 (信東) 衛署藥製字第 015660 號	白色/綠色 長橢圓形 口服/膠囊 ST 007	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙 球菌、腦膜炎球菌及其他具 有感受性細菌引起之感染 症。	請遵照醫師指示完 成全部療程。 (1030826 公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Pamidronate 15 mg/5mL/vial	Aredia 雷狄亞 (諾華) 衛署藥輸字第 020666 號	針劑/注射	Pamisol 裴米索 (赫士睿) 衛署藥輸字第 023633 號	針劑/注射	惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移、惡性高血鈣症。	需以不含鈣的輸注溶液稀釋後緩慢輸注。 (1030828 公告)	894 元
							
Pentoxifylline 400 mg/tab	Fylin 暢循 (正和) 衛署藥製字第 041488 號	桃紅色 橢圓形 口服/錠劑	Pentop 循妥斯 (優生) 衛署藥製字第 041535 號	白色 長橢圓形 口服/錠劑 400 P	末梢血管循環障礙。	請整顆吞服。不可撥半、磨粉。 (1030828 公告)	2.29 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ketorolac 30 mg/1 mL/amp	Keto 克多炎 (永信) 衛署藥製字第 042412 號	針劑/注射	Laston 克痛解 (信東) 衛署藥製字第 047551 號	針劑/注射	短期 (≤5 天) 使用於緩解無法口服之病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。	若出現喉痛嘴破、眼睛癢、皮膚紅疹，應立即停藥回診。 (1030828 公告)	24.2 元
							
Lidocaine 2% 20 mL/vial	Xylocaine 苦息樂卡因 (阿斯特) 衛署藥輸字第 021497 號	針劑/注射	Lidocaine 利都卡因 (台裕) 衛署藥製字第 016475 號	針劑/注射	局部麻醉。	(1030830 公告)	自費 24 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Fosfomycin 4000 mg/vial	Folsmycin 復司黴素 (永信) 衛署藥製字第 039689 號	針劑/注射	UFO 優福 (聯邦化學) 衛署藥製字第 035049 號	針劑/注射	綠膿菌、變形菌、沙雷氏菌、葡萄球菌、大腸桿菌等具有感受性細菌所引起下列感染症 (敗血症、支氣管炎、細支氣管炎、支氣管擴張症、肺炎、肺化膿症、膿胸、腹膜炎、腎盂炎、膀胱炎)。	本院另有同成分、不同規格藥品:UFO® 2000 mg/vial (Fosfomycin) (1030830 公告)	396 元
							



成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Phytonadione 10 mg/1 mL/amp	Phytonadione 血納定 (信東) 內衛藥製字第 002090 號	針劑/注射	Katimin 嘉體民 (中化) 內衛藥製字第 002789 號	針劑/注射	低凝血酶元血症、新生兒之出血症狀、手術時之過多出血之預防及治療、維生素 K 吸收之障礙及缺乏維生素 K 所引起之諸症。	(1030901 公告)	15 元
							
Furosemide 20 mg/2 mL/amp	Rosis 樂泄 (榮民) 衛署藥製字第 027928 號	針劑/注射	Fursemide 扶如泄民 (南光) 內衛藥製字第 005612 號	針劑/注射	利尿、高血壓、急性肺水腫。	(1030901 公告)	15 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Benzbromarone 50 mg/tab	Beenrone 勉治 (永信) 衛署藥製字第 037679 號	白色 圓形 口服/錠劑 Y S	Euricon 優力康 (健喬信元) 衛署藥製字第 042754 號	白色 圓形 口服/錠劑 SY 50	痛風、高尿酸血症。	服藥期間請多喝水。 (1030901 公告)	2 元
							
Lamivudine 150 mg/tab	3TC 速汰滋 (葛蘭素史克) 衛署藥輸字第 022075 號	白色 菱形 口服/錠劑 GX CJ7	UBIAAsia 欄滋 (聯亞生技) 衛署藥製字第 057959 號	白色 菱形 口服/錠劑 UBI06/150	與其他抗反轉錄病毒劑合併使用、治療成人及兒童之人體免疫缺乏病毒 (HIV) 感染。	(1030901 公告)	90.3 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Piroxicam 10 mg/g, 40 g/tube	Focus 伏加斯 (永信) 衛署藥製字第 043214 號	外用/凝膠	Toricam 完疲 (五洲) 衛署藥製字第 039429 號	外用/凝膠	類風濕性關節炎、骨關節炎 (關節痛、退化性關節炎)、 僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。	(1030901 公告)	43.1 元
							
Fusidic acid 2% ; 5 gm/tube	Fucimycin 膚菌淨 (溫士頓) 衛署藥製字第 047289 號	外用/乳膏	Fusidic Acid 褐黴素 (杏輝) 衛署藥製字第 049339 號	外用/乳膏	葡萄球菌、鏈球菌或其他對 Fusidic Acid 敏感的細菌的皮膚感染症。	(1030901 公告)	62 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Etodolac 200 mg/cap	Bodopine 保痛平 (元宙) 衛署藥製字第 046350 號	粉紅色/藍色 長橢圓形 口服/膠囊 0312/0312	Lonine 勞寧 (東生華) 衛署藥製字第 032327 號	紫色/灰色 長橢圓形 口服/膠囊 Lonine 200	類風濕性關節炎，骨關節炎，止痛。	(1030901 公告)	5.2 元
							
Amoxicillin 250 mg/cap	Supercillin 施儂素 (榮民) 衛署藥製字第 010819 號	黃色/紅色 長橢圓形 口服/膠囊 VPP101	Amoxicillin 安蒙西林 (中化) 衛署藥製字第 012051 號	紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 CCP B21	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	(1030903 公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Amoxicillin 25 mg/mL ; 60 mL/bt	Pamoxicillin 泛廣黴素 (聯邦) 衛署藥製字第 012228 號	口服/懸液劑	Amolin 萬博黴素 (永豐) 衛署藥製字第 036160 號	口服/懸液劑	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	(1030903 公告)	31 元
							
Methotrexate	Methotrexate 胺基甲基葉酸 (昱泰) 專案進口	針劑/注射 25 mg/mL ; 500 mg/ 20 mL/vial	Ebetrexat 每索持 (諾華) 衛署藥輸字第 018876 號	針劑/注射 100 mg/mL ; 500 mg/ 5 mL/amp	妊娠性絨毛上皮癌、破壞性絨毛上皮腺腫、水囊狀胎塊、急性、亞急性、淋巴球性及腦膜性白血病、淋巴肉腫。	新舊廠牌藥品規格、濃度均不同。 (1030903 公告) ※原廠商停產。	480 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Cailcum Polystyrene Sulfonate 5 gm/pk	Chalian 鉀利安 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 049388 號	口服/粉劑	Kalimate 加利美 (宜泰) 衛署藥輸字第 013086 號	口服/粉劑	急性及慢性腎不全伴隨之高血鉀症。	請泡水 30-50 mL 後服用；避免與牛奶或制酸劑併服。 (1030903 公告)	12.2 元
							
Furosemide 40 mg/tab	Furide 舒利諾 (生達) 衛署藥製字第 045363 號	白色 圓形 口服/錠劑 STD 282	Uretropic 通舒 (杏林新生) 衛署藥製字第 001047 號	白色 圓形 口服/錠劑 TKP 020	利尿、高血壓。	請於白天服用，避免夜間利尿。 (1030905 公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ofloxacin 0.3% 5mL/bot	Thamic 宜剋菌 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 048354 號	外用/耳滴劑	Earflo 耳復欣 (瑞士) 衛署藥製字第 047116 號	外用/耳滴劑	成人及小兒外耳炎・成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。	(1030905 公告)	70 元
							
Hyaluronate sodium 25 mg / 2.5 mL/ syringe	ArtiAid 安節益 (和康) 衛署醫器製字第 002173 號	針劑/注射	ARTZDispo 雅節 (泰宗) 衛署醫器輸字第 008815 號	針劑/注射	限用於保守性非藥物治療無效及一般鎮痛劑如 A C E T - A M I N O P H E N・治療無效之退化性膝關節炎疼痛患者。	(1030905 公告)	自費價 1099 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Docetaxel 20 mg/1 mL/vial	Taxotere 剋癌易 (賽諾菲) 衛署藥輸字第 025289 號	針劑/注射	Tynen 鈦能 (東洋) 衛署藥製字第 057240 號	針劑/注射	乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。	2-8℃，避光儲存。 (1030909 公告)	4093 元
							
Clozapine 25 mg/tab	Clozaril 可致律 (諾華) 衛署藥輸字第 018541 號	黃色 圓形 口服/錠劑 SANDOZ/LO	Clopine 克慮平 (瑞士) 衛署藥製字第 042621 號	米黃色 圓形 口服/錠劑 LD/SWISS	其他藥物治療失效的精神分裂症病患。	可能造成嗜睡效果，請小心。請勿飲酒。 (1030910 公告)	5.8 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Haloperidol 5 mg/tab	Binin-U 易優寧 (瑞士) 衛署藥製字第 032584 號	綠色 圓形 口服/錠劑 十字剝痕	Halin 哈寧 (優生) 衛署藥製字第 031505 號	綠色 圓形 口服/錠劑 YS H5	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。	(1030911 公告)	2.93 元
							
Gabapentin 600 mg/tab	Neurontin 鎮頑癲 (輝瑞) 衛署藥輸字第 023672 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 NT 16	Gaty 立穩癲 (瑩碩) 衛署藥製字第 047905 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 AX 026/600	治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀疱疹後神經痛	(1030911 公告)	15.7 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Isoniazid 100 mg/tab	Isoniazid 異菸鹼鹽月井 (溫士頓) 署藥製字第 013083 號	白色 圓形 口服/錠劑	Lunging 癆寧 (健康化學) 衛署藥製字第 004194 號	白色 圓形 口服/錠劑	結核病。	(1030912 公告)	2 元
							
Estradiol & Norethisterone 1 & 0.5 mg/tab	Komeni 康美 (永勝) 衛署藥製字第 044917 號	白色 圓形 口服/錠劑 KME 288	Havina 伴樂娜 (健喬信元) 衛署藥製字第 044203 號	白色 圓形 口服/錠劑 SYN 288	停經超過一年以上婦女之雌 激素缺乏引起的症狀。	(1030913 公告)	103.32 元/片
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Amphotericin B Liposome 50 mg/vial	AmBisome 脂黴素 (GILEAD) 衛署藥輸字第 023388 號	針劑/注射	Lipo-AB 立博黴 (東洋) 衛署藥製字第 057992 號	針劑/注射	治療黴菌引起之感染症。 冷藏保存；只可用等張葡萄糖溶液稀釋。 (1030913 公告)	6547 元	
							
Fluoxetine 20 mg/cap	Kinxetin 抗憂佳 (景德) 衛署藥製字第 041280 號	黃色/綠色 長橢圓形 口服/膠囊 KDM G5359	Uxetine 憂適停 (中化) 衛署藥製字第 042837 號	黃色/綠色 長橢圓形 口服/膠囊 CCP B54	抑鬱症、暴食症、強迫症。(1030915 公告)	3.3 元	
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Acetylcysteine	Acetine 膿化清 (臺裕) 衛署藥製字第 029758 號	口服/顆粒劑 1.5 gm/pk	Actein 愛克痰 (健喬信元) 衛署藥製字第 037598 號	口服/顆粒劑 3 gm/pk	減少呼吸道黏膜分泌物的粘稠性。	新舊廠牌藥品規格、含量均不同。 (1030919 公告)	1.77 元
							
Parenteral Solution 500 mL/ bt	Y F No.5 永福 5 號 (永豐化學) 衛署藥製字第 039278 號	針劑/注射	Nako No. 5 南光 5 號 (南光) 衛署藥製字第 029334 號	針劑/注射	手術前後及未能進食之病人之水份、電解質、熱能補充或維持液。	(1030919 公告)	30.3 元
							

103 年 09 月停用藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Polyvidone 20 mg/0.4 mL/vial	Refresh 麗眼舒 (愛力根) 衛署藥輸字第 023834 號	外用/眼用	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	※ 藥 委 會 決 議 ： Sodium Carboxymethylcellulose (Refresh® Plus Lubricant Eye Drops) 進藥後，停用 Refresh® Eye Drop。 (1030828公告)	120元
					
Lansoprazole 30 mg/tab	Takepron OD 泰克胃通 (武田) 衛署藥輸字第 024273 號	粉紅色 圓形 口服/口溶錠	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療，胃食道逆流性疾病之症狀治療。Zollomger-Ellison症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌 (Helicobacter pylori) 相關的消化性潰瘍、治療因NSAID類藥物引起之胃潰瘍。	※藥委會決議: Dexlansoprazole (Dexilant® DR) 60 mg/cap 進藥後，停用 Takepron® OD。 (1030905公告)	21.4元
					